

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗОМ

КП «2-А МКЛІ ПМР»

від 28.08 2025р. № 26-98

Показання та протипоказання

до лікування в умовах денного стаціонару поліклініки

Показання:

Хворі терапевтичного профілю:

- ІХС, стенокардія стабільна, постінфарктний кардіосклероз, хронічна серцева недостатність не вище ІІА ступеня, гіпертонічна хвороба І-ІІст., вегетосудинна дистонія;
- системні захворювання сполучної тканини без вираженої активності процесу;
- виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки в стадії загострення без ускладнень (окрім вперше виявленої), хронічна диспепсія, хронічний гастродуоденіт в ст. загострення, хронічний некалькульозний холецистит в ст. загострення, хронічний панкреатит в ст. загострення без ознак постійного рецидивування та тяжкого больового і диспепсичного синдромів, цироз печінки без вираженої активності процесу та ознак портальної гіпертензії з наявністю асцити, синдром подразненого кишківника;
- хронічні обструктивні захворювання легень в ст. загострення, хронічний бронхіт в ст. загострення, ЛН І-ІІст., бронхіальна астма середньої тяжкості;
- хронічна хвороба нирок: пієлонефрит, ст. загострення, ХНН 0-Іст.;
- цукровий діабет 1 та 2 тип, ст. компенсації та субкомпенсації;
- патологія опорно-рухового апарату: коксартроз, гонартроз, поліартроз, артрит;
- онкологічна патологія в стадії ремісії.

Хворі дерматологічного профілю:

- захворювання шкіри: гостра кропив'янка, псоріаз в ст. загострення, екзема в ст. загострення, мікробна екзема, пухирчатка, токсикодермія, алергічний дерматит, червоний плоский лишай.

Хворі отоларингологічного профілю:

- хронічна нейросенсорна приглухуватість;
- гострий та хронічний риносинусит в ст. загострення, що не потребує дренивання.

Хворі неврологічного профілю:

- дисциркуляторна енцефалопатія II-III ст.;
- церебральний криз;
- залишкові явища нейроінфекції;
- остеохондроз (шийного, грудного, попереково-крижового відділів хребта) в ст. загострення;
- розсіяний склероз в ст. ремісії.

Хворі хірургічного профілю:

- облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок ХАН I-IIA;
- діабетична ангіопатія судин нижніх кінцівок;
- посттромбофлебітичний синдром, не вище С3 стадії.

Хворі інфекційного профілю:

- цироз печінки асоційований вірусним гепатитом В чи С в фазі авіремії, без вираженої активності процесу та ознак портальної гіпертензії з наявністю асцити;
- хронічні вірусні гепатити В чи С в фазі авіремії, без вираженої активності процесу;
- хвороба/синдром Жильбера;
- хвороба Лайма;

Хворі офтальмологічного профілю:

- глаукома відкритокутова;
- макулодистрофія;
- міопія високого ступеню;
- запальні хвороби переднього та заднього відділу ока;

—гемофтальм.


Протипоказання:

- гострі інфекційні захворювання,
- хронічні гепатити з активною реплікацією вірусу,
- венеричні хвороби,
- туберкульоз,
- грибкові та паразитарні хвороби шкіри,
- декомпенсована органічна патологія,
- туберкульоз,
- онкологічна патологія в стадії декомпенсації,
- захворювання, що потребують цілодобового лікарського спостереження.

Також у прийомі може бути відмовлено, якщо хворий перебуває у стані сп'яніння або психозу.

На момент надходження пацієнт має бути здатним до самообслуговування і самостійного пересування.

Медичний директор



Юлія КАСІЧ